

du prothorax et des pattes, mais s'en éloigne par celle des antennes et des élytres qui sont nuancés ainsi que chez le *L. circumfusus*.

Trois exemplaires provenant de Hinterbrühl (Autriche) et un de Comana Vlaska (Roumanie); ce dernier m'a été procuré par M. L. MONTANDON.

### Description d'une Noctuelle nouvelle de la Guyane française

[LEP. ACRONYCTAE].

par Ed. BRABANT.

**Pseudacontia? rhizoleuca**, n. sp. — Envergure : 34 mill. — Ailes supérieures larges, subtriangulaires; la côte modérément incurvée au dernier quart; le côté externe, d'abord presque droit, puis fortement arrondi à l'angle interne; couleur brun noirâtre brillant, les espaces costal et subterminal garnis d'écailles gris cendré à reflet violacé ou pourpre; une grande tache basilaire fusiforme, oblique, commençant à la base de la côte et finissant au tiers du bord interne, d'un blanc d'argent finement bordé de noir extérieurement. Premières lignes indistinctes; l'extrabasilaire (antémédiane) indiquée à la côte par une petite tache grisâtre bordée de noir des deux côtés; la coudée (postmédiane) plus nette, d'un brun à peine plus clair que le fond de l'aile, très festonnée et bordée de chaque côté d'une ligne noirâtre formant de petits croissants entre les nervures: elle commence à la côte, peu après le milieu, par une tache grisâtre, s'étend du côté externe sur la sous-costale, s'arrondit vers le dernier quart de l'aile, se rapproche de la cellule et descend festonnée de la nervure 5 à la 2, puis zigzagüe jusqu'au bord interne, au dernier quart. L'espace subterminal présente une série de points noirs, disposés entre les nervures et suivant les contours de la ligne postmédiane: les points situés entre les nervures 3 et 4, 6 et 7, 7 et 8 sont très gros; les autres très petits. La tache orbiculaire légèrement cerclée de blanchâtre ou seulement indiquée par des points en carré ou trapèze. La tache réniforme indiquée par des points blanc crème en carré ou trapèze, le point inférieur externe superposé à un autre petit point de même couleur, trois petits traits virgulaires ou points blanchâtres à la côte après la postmédiane. La frange est brune.

Ailes inférieures d'un brun légèrement cuivré, plus clair à la base, plus foncé vers le bord externe; la frange de la même couleur.

Dessous des ailes supérieures d'un brun noir avec quelques atomes blanchâtres le long de la côte et du bord externe; la ligne postmédiane du dessus indiquée légèrement en plus clair, avec bordure interne brune plus épaisse et plus continue; frange concolore.

Dessous des inférieures d'un blanc sale, enfumé dans la région de la côte et du bord externe; une ligne postmédiane noirâtre indiquée d'une façon un peu confuse; un trait noirâtre dans la cellule.

Tête brune; antennes ciliées, brunes; palpes bruns, dressés, 2<sup>e</sup> article velu avec poils en touffe légère en dessus; 3<sup>e</sup> article assez court. Collier, ptérygodes et thorax d'un blanc brillant comme la tache basilaire. Abdomen brun, sauf le premier segment blanc.

Pattes brunes, les jambes assez fortement velues, les tarsi finement annelés de blanc.

Plusieurs exemplaires capturés par M. LE MOULT, à St-Laurent et à St-Jean du Maroni (Guyane française) en juin et juillet.

Ma collection.

### Description de trois espèces nouvelles de *Catocalinae*

[LEP. NOCTUIDAE]

par J. DE JOANNIS.

Les deux premières espèces ci-dessous proviennent de la région nord de Madagascar où elles ont été prises par M. le commandant DE BOLLARDIÈRE, qui a bien voulu les offrir à mon frère pour notre collection. La troisième a été prise par M. le Capitaine CAMPAGNE, à Anchan (Tonkin.)

Sir G. F. HAMPSOX, qui a eu l'obligeance de les examiner, a reconnu que la première de ces espèces doit constituer un genre nouveau qui peut être caractérisé comme il suit :

**Miniophyllodes**, nov. gen. — Trompe présente; palpes redressés obliquement; 2<sup>e</sup> article atteignant le vertex et frangé de poils en avant et en arrière; 3<sup>e</sup> article long, frangé de poils et spatulé à l'extrémité; front portant une touffe de poils; antennes ciliées avec quelques cils plus longs; tous les tibiais épineux; abdomen avec la base garnie de poils un peu soulevés; aux ailes antérieures, 10 juste après l'aréole; aux postérieures, cellule atteignant la moitié de l'aile, 3 avant l'angle, 5 au-dessus de l'angle.

**Miniophyllodes aurora**, n. sp. — ♂. *Exp. al.* : 72 mill. An-